


Regard santé

l'aire de Chambly



→ Présentation de l'aire


L'aire de Chambly comprend **un seul canton**, celui de Neuilly-en-Thelle.

Au recensement de 2006, on dénombre 29 655 habitants, soit une densité de 212,8 habitants au km². Cette densité est plus forte que celles constatées dans l'Oise (135,3 h/km²), en Picardie (97,6 h/km²) et en France métropolitaine (112,9 h/km²).

Les **moins de 25 ans** constituent 35,6 % de la population de l'aire en 1999, ce qui est plus élevé que dans le département (34,0 %), la région (33,1 %) et qu'au niveau national (30,9 %).

La proportion de personnes âgées de **25 à 59 ans** est de 50,6 % dans l'aire, soit plus que dans les trois entités géographiques de référence (49,4 % dans l'Oise, 47,8 % en Picardie et 47,8 % en France métropolitaine).

La part d'habitants de l'aire de **75 ans et plus** est à l'inverse plus faible dans l'aire (4,6 %) que dans l'Oise (5,5 %), qu'en Picardie (6,6 %) et qu'en France métropolitaine (7,7 %).



L'**indice conjoncturel de fécondité** (ICF) est de 1,93 enfant par femme en 2003-2006. Cet indice est inférieur à ceux de l'Oise (2,07) et de la Picardie (2,00) et proche de celui de la France métropolitaine (1,90).

Le taux de naissances pour les **mères mineures** est particulièrement bas au regard des références sur cette même période : 3,9 pour 1 000 naissances contre 7,6 ‰ dans l'Oise, 9,6 ‰ en Picardie et 5,6 ‰ en France métropolitaine.

Entre 2001 et 2004, il y a eu 1 561 naissances domiciliées (dont les parents résident dans l'aire), dont 63,4 % ont eu lieu dans le département voisin du Val d'Oise et 11,2 % à Creil-Nogent.

Sur la même période, on dénombre 1 325 décès d'habitants de l'aire dont 53,2 % se sont produits dans le Val d'Oise et 16,2 % à Creil-Nogent.

SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S



l'Assurance
Maladie

Service Médical
Nord-Pas-de-Calais Picardie

→ Données sociales

Un revenu moyen élevé, moins de bénéficiaires d'aides sociales

Le **revenu moyen** annuel imposable des habitants de l'aire de Chambly en 2005 est supérieur à ceux des entités de référence : 18 693 € contre 17 447 € pour l'Oise, 15 938 € en Picardie et 17 165 € en France métropolitaine.

De ce fait, le pourcentage de foyers **non imposables** dans l'aire y est plus bas : 37,1 % contre 42,5 % dans l'Oise, 47,8 % en Picardie et 46,2 % en France métropolitaine.

En 2004, le taux de bénéficiaires de l'**aide ménagère** dans l'aire de Chambly est de 16,9 pour 1 000 personnes de 65 ans et plus, ce qui est en dessous des taux isarien (20,7 ‰) et picard (21,3 ‰).

En 2005, le taux de bénéficiaires de l'**allocation personnalisée d'autonomie** (APA) à domicile est un des plus bas de la Picardie (69,9 pour 1 000 personnes de 75 ans et plus). Ce taux est de 72,7 ‰ dans l'Oise, de 117,7 ‰ en Picardie et de 149,4 ‰ en France métropolitaine.

On dénombre 1 056 **demandeurs d'emploi en fin de mois** (DEFM) de catégorie 1 dans l'aire de Chambly en 2004.

On observe parmi eux un pourcentage de moins de 25 ans de 20,9 % dans l'aire contre 23,5 % dans l'Oise et 24,8 % en Picardie.

À l'inverse, le pourcentage de personnes de 50 ans et plus parmi les DEFM est plus élevé dans l'aire (16,7 %) que dans l'Oise (14,3 %) et qu'en Picardie (13,6 %).


Les chômeurs de longue durée (DEFM depuis 1 an et plus) de l'aire (27,7 %) représentent une part plus faible que celles de l'Oise (30,6 %) et de la Picardie (33,9 %).

En 2004, on compte dans l'aire de Chambly 168 allocataires du **revenu minimum d'insertion** (RMI), soit un taux d'allocataires de 16,3 pour 1 000 ménages. Ce taux est sensiblement inférieur à ceux de l'Oise (36,8 ‰) et de la Picardie (42,3 ‰).

De la même manière, le taux d'allocataires du RMI parmi les familles monoparentales (54,9 ‰) est près de deux fois inférieur aux taux isarien (116,9 ‰) et picard (133,4 ‰).


Le rapport est encore plus élevé pour le taux d'allocataires parmi les couples : 2,5 ‰ dans l'aire contre 11,2 ‰ dans l'Oise et 14,5 ‰ en Picardie.

Enfin, le taux d'allocataires du RMI de 25-49 ans en 2004 est également moins élevé dans l'aire (10,7 ‰) qu'aux niveaux départemental (26,6 ‰) et régional (33,4 ‰).



Sources : Conseils généraux 02, 60 et 80, Insee, OR2S

2



Sources : Cpam, MSA, RSI, Insee, OR2S

En 2005, on compte 108 bénéficiaires de la **CMU de base** dans l'aire de Chambly, soit un taux de 3,5 pour 1 000 habitants, ce qui est, là encore, bien inférieur aux taux constatés dans l'Oise (13,6 ‰), en Picardie (16,1 ‰) et en France métropolitaine (22,1 ‰).

On dénombre 663 bénéficiaires de la **CMU complémentaire**, soit un taux de 21,3 pour 1 000 habitants, ce qui est trois fois inférieur aux taux de l'Oise (70,7 ‰), de la Picardie (89,6 ‰) et de la France métropolitaine (67,5 ‰).

→ Professionnels de santé


Des généralistes moins nombreux que dans le département, la région et le pays

En novembre 2006, on compte 22 **médecins généralistes**, soit une densité de 6,9 médecins pour 10 000 habitants de l'aire. Cette densité est inférieure à celles des trois entités géographiques de référence (8,6 dans l'Oise, 9,7 en Picardie et 11,2 en France métropolitaine).

Les femmes représentent 31,8 % des effectifs, soit plus que dans l'Oise (30,5 %), qu'en Picardie (27,6 %) et qu'en France métropolitaine (29,4 %)

L'âge moyen des généralistes est de 50,0 ans dans l'aire (49,6 ans dans l'Oise, 49,4 ans en Picardie et 49,8 ans en France métropolitaine).

On compte 1 **spécialiste** dans l'aire de Chambly en novembre 2006, soit une densité de 0,3 pour 10 000 habitants (5,2 dans l'Oise et la Picardie et 3,8 en France métropolitaine).



Sources : Adeli, Insee, OR2S

En avril 2007, on compte 7 **chirurgiens dentistes** (dont deux femmes) dans l'aire de Chambly. La densité médicale est de 2,2 dentistes pour 10 000 habitants de l'aire, soit moins que dans l'Oise (4,0), qu'en Picardie (4,0) et qu'en France métropolitaine (6,2). La moyenne d'âge des dentistes de l'aire est de 46,4 ans (contre 48,4 ans dans l'Oise, 48,2 ans en Picardie et 47,8 ans en France métropolitaine) et un seul a 55 ans ou plus.

Les **auxiliaires médicaux** (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes) sont au nombre de 39 dans l'aire de Chambly, ce qui représente une densité de 12,3 pour 10 000 habitants. Cette densité est supérieure à l'indicateur isarien (11,8) mais inférieure aux moyennes picarde (13,8) et française (21,9).


Parmi eux, 28 sont des femmes, soit 71,8 % de l'effectif (69,7 % dans le département, 71,0 % en région et 69,0 % au niveau national).

L'âge moyen des auxiliaires médicaux est de 42,3 ans dans l'aire contre 43,5 ans dans l'Oise, 43,4 ans en Picardie et 43,6 ans en France métropolitaine. Les auxiliaires âgés de 55 ans et plus ne représentent que 10,3 % des effectifs, contre 16,9 % dans le département, 19,1 % en région et 18,3 % au niveau national.

On compte 19 **infirmières** (toutes des femmes) exerçant dans l'aire de Chambly, soit une densité de 6,0 pour 10 000 habitants en avril 2007. Celle-ci est supérieure à celle du département (5,5), mais inférieure à celles de la région (7,1) et du niveau national (11,2).

L'âge moyen des infirmières de l'aire est de 43,8 ans, soit un âge légèrement inférieur aux valeurs de référence (44,1 ans dans le département, 44,6 ans en région et 44,9 ans au niveau national). La part des 55 ans et plus est quant à elle plus faible : 10,5 % dans l'aire contre 13,5 % dans l'Oise, 17,8 % en Picardie et 16,5 % en France métropolitaine.

Les **pharmacies** de l'aire de Chambly sont au nombre de 10, soit une densité de 3,3 pour 10 000 habitants. Cette densité est équivalente à celles du département (3,1) et de la région (3,3).



Sources : Adeli, OR2S

Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, les habitants de l'aire de Chambly ont consulté un médecin généraliste de l'aire dans 60,1 % des cas, les autres consultations se sont déroulées dans des cantons limitrophes.


Les consultations d'ophtalmologistes ont toutes été données à l'extérieur de l'aire, dont plus de la moitié dans le département du Val d'Oise. Même constat pour les consultations de gynécologie obstétrique et dermatologie, majoritairement données dans le Val d'Oise. Une grande partie des consultations de gynécologie médicale furent données à Creil (49,2 %).

→ Mortalité et ALD

Un taux de mortalité prématurée proche du taux national

En 2000-2004, l'**espérance de vie** à la naissance des hommes de l'aire de Chambly est de 74,2 ans, ce qui est proche de l'Oise et de la Picardie (respectivement 74,8 ans et 74,1 ans) et inférieur à la France métropolitaine (75,9 ans).

Pour les femmes, l'espérance de vie dans l'aire est de 82,0 ans. Cette espérance de vie est également proche des niveaux isarien et picard (82,0 ans et 81,7 ans) et inférieure au niveau national (83,2 ans).



Le taux de **mortalité générale** est de 1 083,3 pour 100 000 habitants en 2000-2004 (soit 208 décès annuels en moyenne), ce qui situe l'aire de Chambly légèrement au-dessus des taux isarien (1 014,9), picard (1 052,7) et français (911,3).

Le taux de **mortalité prématurée** (mortalité avant 65 ans) est en dessous de ceux de l'Oise et de la Picardie (223,4 pour 100 000 contre respectivement 243,2 et 262,7) mais est proche du taux français (221,5).

Les maladies de l'appareil circulatoire et les tumeurs sont à l'origine de plus de la moitié des décès féminins (55,6 %) et masculins (55,5 %).

Chez les femmes, les maladies de l'**appareil circulatoire** constituent la première cause de mortalité (32,4 % des décès) devant les tumeurs (19,2 %).

Cet ordre est inversé chez les hommes : les **tumeurs** sont la cause de 32,0 % des décès et les maladies de l'**appareil circulatoire**, de 23,5 %.

Les **causes externes de mortalité** (accidents, suicides...) se classent au troisième rang chez les hommes (10,3 %) comme chez les femmes (7,1 %).

Le taux de **mortalité par suicide** dans l'aire de Chambly est de 21,6 décès pour 100 000 habitants en 2000-2004. Ce qui est supérieur à ceux de l'Oise (20,6) et de la France métropolitaine (18,0) et inférieur à celui de la Picardie (23,1).

Le taux de mortalité par **accident de la circulation** (12,8 décès pour 100 000 habitants) est supérieur au taux français (10,8) mais inférieur à ceux du département et de la région (respectivement 14,7 et 14,3).

Le taux de **séjours hospitaliers** en 2004-2005 dans l'aire est de 256,2 pour 1 000 habitants, soit 7 116 séjours d'habitants de l'aire en moyenne par an. Ce taux est plus faible que dans l'Oise (299,9 %) et qu'en Picardie (289,3 %).

Le nombre d'**admissions annuelles en affections de longue durée** (ALD) dans l'aire est de 446 entre 2004 et 2005 et concerne à 53,2 % les hommes.

Les tumeurs malignes sont la première cause d'admissions en ALD tandis que le diabète représente la deuxième cause.

Le **diabète** fait partie des maladies qui induisent à terme d'autres affections telles que les maladies cardiovasculaires, neurologiques, ophtalmologiques et/ou rénales. Une étude met en évidence un non prise en charge en ALD d'environ un cas sur quatre.

Le taux d'admissions en ALD de l'aire pour diabète (291,4 pour 100 000) est inférieur à ceux de l'Oise (308,2) et de la Picardie (311,4) et supérieur à celui de la France métropolitaine (266,5).

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Tumeurs malignes	47	22,4	1	53	22,4	1
Diabète	30	14,3	2	42	17,5	2
Hypertension artérielle sévère	26	12,6	3	27	11,5	3
Affections psychiatriques de longue durée	24	11,6	4	21	9,1	5
Pathologies cardiaques graves	16	7,5	5	17	7,1	6
Maladie d'Alzheimer et autres démences	13	6,0	6	2	1,0	13
Insuffisance respiratoire chronique grave	8	4,0	7	11	4,5	8
Maladie coronaire	8	3,8	8	22	9,3	4
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses	5	2,3	9	6	2,5	9
Artériopathies chroniques graves	5	2,3	10	12	5,3	7
Accident vasculaire cérébral	4	2,0	11	6	2,5	10
Autres causes de nouvelles admissions	24	11,3	-	17	7,4	-
Total	209	100		237	100	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

→ Maladies de l'appareil circulatoire

Des mortalités par cardiopathies ischémiques et AVC plus importantes

Les maladies de l'**appareil circulatoire** comprennent l'hypertension artérielle sévère (HTA), les pathologies cardiaques graves, les cardiopathies ischémiques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et l'artériopathie chronique. Les admissions en ALD pour maladies cardiovasculaires sont au nombre de 144 par an en moyenne en 2004-2005 dans l'aire (85 hommes et 59 femmes). Ces admissions représentent un taux de 642,4 pour 100 000 habitants, ce qui est plus élevé que dans l'Oise (638,7), qu'en Picardie (602,0) et qu'en France métropolitaine (586,1).

Le taux de séjours hospitaliers pour ces pathologies est de 27,4 pour 1 000 (soit 641 par an), ce qui est proche des moyennes de l'Oise (27,3 ‰) et de la Picardie (27,8 ‰).

Le taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire dans l'aire est de 327,6 pour 100 000 habitants en 2000-2004. Ce taux est supérieur aux taux isarien (297,8), picard (314,2) et français (271,8).


En 2004-2005, 156 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an font suite à une **cardiopathie ischémique**, soit un taux de 6,7 pour 1 000. Ce taux est légèrement supérieur à ceux de l'Oise (6,0 ‰) et de la Picardie (6,1 ‰).

Le taux de mortalité par cardiopathie ischémique (104,9 pour 100 000 habitants) est également supérieur à ceux du département (82,5), de la région (86,6) et du niveau national (74,6).

Le taux d'admissions en ALD pour **accident vasculaire cérébral (AVC)** est de 42,1 pour 100 000 habitants, soit 10 admissions en moyenne par an (6 hommes et 4 femmes). Ce taux est inférieur aux taux isarien (57,4), picard (56,7) et français (60,5).

Le taux de séjours hospitaliers d'habitants de l'aire pour cette pathologie est proche de ceux de l'Oise et de la Picardie (3,3 pour 1 000 contre 3,3 ‰ et 2,8 ‰), soit 71 séjours d'habitants de l'aire en moyenne par an en 2004-2005.

Entre 2000 et 2004, le taux de mortalité pour cette pathologie est de 75,9 pour 100 000 habitants, ce qui est supérieur à ceux de l'Oise (67,5), de la Picardie (69,6) et de la France métropolitaine (63,4).



Le taux d'admissions en ALD pour **pathologie cardiaque grave** de l'aire de Chambly (154,4 pour 100 000) est proche du taux de l'Oise (153,1) et supérieur à ceux de la Picardie (149,7) et de la France métropolitaine (140,1). On compte 33 admissions par an dans l'aire (17 hommes et 16 femmes) pour cette pathologie en 2004-2005.

En 2004-2005, on compte 30 admissions annuelles pour **maladie coronaire** dans l'aire (22 hommes et 8 femmes).

Le taux d'admissions en ALD pour cette pathologie dans l'aire (133,7 pour 100 000 habitants) se situe en dessous des taux départemental (147,8), régional (150,0) et national (140,8).

Le taux d'admissions en ALD pour **hypertension artérielle sévère** est supérieur aux entités géographiques de référence : 239,3 pour 100 000 habitants contre 203,9 dans l'Oise, 164,4 en Picardie et 170,2 en France métropolitaine. En tout, ce sont 53 admissions (27 hommes et 26 femmes) constatées en moyenne par an dans l'aire en 2004-2005.

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une exonération du ticket modérateur pour une autre affection de longue durée.


→ Cancers et tumeurs

Une mortalité par cancer de la prostate importante

Le taux d'admissions en ALD pour **tumeurs malignes** est de 413,4 pour 100 000 habitants dans l'aire de Chambly, soit moins que dans l'Oise (482,4), qu'en Picardie (497,8) et qu'en France métropolitaine (483,1). Les tumeurs représentent 100 admissions par an en moyenne entre 2004 et 2005 dans l'aire (47 femmes et 53 hommes).

En 2004-2005, 550 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire ont été enregistrés pour l'ensemble des tumeurs, soit un taux de 21,4 pour 1 000 habitants. Ce taux est inférieur à ceux de la Picardie (24,3 ‰) et de l'Oise (26,9 ‰).


Le taux de mortalité pour l'ensemble des tumeurs est inférieur dans l'aire (256,5 pour 100 000 habitants) à ceux de l'Oise (278,7), de la Picardie (286,6) et de la France métropolitaine (257,8).



Le taux d'admissions en ALD des hommes de l'aire de Chambly pour **cancer de la prostate** (199,6 pour 100 000 habitants) est légèrement supérieur à l'indicateur français (198,0) et inférieur à ceux de l'Oise (203,9) et de la Picardie (209,5). Chez les 65 ans et plus, le taux d'admissions en ALD est de 986,1 pour 100 000 dans l'aire contre 963,1 dans l'Oise, 969,5 en Picardie et 915,3 en France métropolitaine. En 2004-2005, on compte 17 admissions en ALD par an en moyenne pour des hommes de l'aire, dont 12 ont 65 ans et plus.

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer de la prostate (3,5 pour 1 000 habitants, soit 32 séjours d'habitants de l'aire par an en 2004-2005) est proche des taux du département (3,9 ‰) et de la région (3,9 ‰).

Le taux de mortalité par cancer de la prostate dans l'aire de Chambly (75,8 décès pour 100 000 habitants) est supérieur à ceux de l'Oise (50,2), de la Picardie (53,8) et de la France métropolitaine (45,1).




Le taux d'admissions en ALD des femmes pour **cancer du sein** est moins élevé dans l'aire que dans les entités de référence : 151,6 pour 100 000 habitantes (21 admissions dont 18 pour des femmes de moins de 65 ans) contre 169,8 pour l'Oise, 172,6 pour la Picardie et 175,3 pour la France métropolitaine.

En 2004-2005, 73 hospitalisations par an pour un cancer du sein ont eu lieu pour des habitantes de l'aire. Ceci représente un taux de 4,8 pour 1 000 habitantes, ce qui est proche des taux isarien (4,9 ‰) et picard (4,4 ‰).

Le taux de mortalité pour ce cancer est plus élevé dans l'aire (37,4 décès pour 100 000 habitantes) que dans l'Oise (36,6) et qu'en France métropolitaine (33,2) et proche de la Picardie (37,3).

→ Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

En 2004-2005, 9 habitants de l'aire de Chambly (4 hommes et 5 femmes) ont été admis en moyenne par an en ALD pour un **cancer du côlon-rectum**, soit un taux de 37,4 pour 100 000. Ce taux est inférieur aux taux isarien (45,8), picard (46,8) et français (48,4).

Le taux de séjours hospitaliers est également moins élevé dans l'aire (1,4 pour 1 000) que dans le département (2,5 ‰) et qu'en région (2,3 ‰). Cela concerne 35 séjours d'habitants de l'aire par an (15 hommes et 20 femmes) pour cette pathologie.

La mortalité pour ce cancer est plus faible dans l'aire (22,9 décès pour 100 000 habitants) que dans l'Oise (26,1), qu'en Picardie (28,9) et qu'en France métropolitaine (27,8).

Le taux de séjours hospitaliers pour **cancer des voies aérodigestives supérieures** (VADS) est inférieur dans l'aire à ceux de l'Oise et de la Picardie : 1,0 pour 1 000 (soit 29 séjours par an) contre 1,5 ‰ dans le département et la région.

Inversement, la mortalité par cancer des VADS est supérieure dans l'aire (26,4 pour 100 000) à celles de l'Oise (20,3), de la Picardie (22,2) et de la France métropolitaine (17,3).

Le taux de séjours hospitaliers d'habitants de l'aire (1,8 pour 1 000) pour **cancer de la trachée, des bronches et du poumon** est inférieur au département (3,3 ‰) et à la région (2,8 ‰). En 2004-2005, cela correspond à 47 séjours en moyenne par an pour des habitants de l'aire (31 hommes et 16 femmes).

La mortalité liée à cette pathologie (47,4 pour 100 000 habitants) est supérieure à celle que l'on rencontre au niveau national (44,0) et inférieure à celles du département (49,0) et de la région (50,0).

→ Asthme

En 2006, 2 165 assurés du régime général ont **reçu un traitement contre l'asthme*** (1 138 femmes et 1 027 hommes), quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit **9,9 % des assurés** de l'aire de Chambly. Ce taux est proche de ceux de l'Oise (9,5 %) et de la Picardie (10,3 %). Les taux féminins et masculins sont équivalents dans l'aire : 10,0 % des femmes et 9,9 % des hommes.

Les 0-12 ans sont 12,9 % à avoir reçu un traitement pour cette pathologie dans l'aire de Chambly, soit 500 jeunes en 2006. Ce taux est également proche des taux départemental (11,5 %) et régional (12,0 %). Les filles de l'aire sont moins concernées que les garçons : 10,9 % des filles (9,7 % dans l'Oise et 10,1 % en Picardie) contre 14,7 % des garçons (13,3 % et 13,9 %).

* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.

→ Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Un taux d'admissions en ALD pour affections psychiatrique de longue durée plus élevé que dans le département et la région



En 2004-2005, 45 habitants de l'aire de Chambly ont été admis par an en ALD pour **affections psychiatriques de longue durée** (21 hommes et 24 femmes), soit un taux d'admissions (154,9 pour 100 000 habitants) supérieur aux taux départemental (139,6) et régional (131,9) mais inférieur au taux national (169,8).

Le taux de séjours hospitaliers pour troubles mentaux et du comportement en 2004-2005 est inférieur dans l'aire (6,0 séjours pour 1 000 habitants, soit 160 séjours par an dont 88 de femmes) à ceux de l'Oise (10,4 ‰) et de la Picardie (7,5 ‰).

L'aire de Chambly enregistre en 2004-2005 15 admissions en ALD par an pour **maladie d'Alzheimer** et autres démences (13 femmes et 2 hommes), soit un taux de 82,2 admissions pour 100 000 habitants. Ce taux est plus faible que ceux du département (91,7), de la région (89,5) et du pays (86,2).

En 2006, 46 personnes du régime général âgées de 70 ans et plus ont reçu un **traitement anti-Alzheimer** dans l'aire de Chambly (31 hommes et 15 femmes). Cela représente 2,6 ‰ des 70 ans et plus du régime général de l'aire (2,6 ‰ dans l'Oise et 2,8 ‰ en Picardie).

Les femmes sont davantage traitées avec ces médicaments : 2,7 ‰ des femmes contre 2,4 ‰ des hommes, tendance que l'on retrouve au niveau du département (2,9 ‰ des femmes contre 2,0 ‰ des hommes) et de la région (3,2 ‰ des femmes contre 2,1 ‰ des hommes).



En 2006, 4 444 assurés de l'aire de Chambly ont été **remboursés au moins une fois pour un psychotrope**, soit 22,2 ‰ des assurés, ce qui est proche du taux de l'Oise (22,1 ‰) et inférieur à celui de la Picardie (24,1 ‰). Les femmes ont davantage eu ce genre de prescriptions que les hommes : 27,0 ‰ contre 16,9 ‰.

Les psychotropes les plus remboursés sont les **anxiolytiques**. Il s'agit de médicaments contre l'anxiété qui peuvent également être utilisés dans certains cas d'épilepsie. En 2006, 3 106 assurés de l'aire de Chambly ont été remboursés pour un anxiolytique, soit 15,3 ‰ des assurés (19,5 ‰ des femmes et 10,5 ‰ des hommes). Ce taux est également proche de l'Oise (15,0 ‰) et moins élevé qu'en Picardie (16,4 ‰).

Les **antidépresseurs** ont été remboursés en 2006 à 1 576 assurés de l'aire de Chambly, soit 7,7 ‰ des assurés (10,4 ‰ des femmes et 4,8 ‰ des hommes). Ce taux est identique à celui de l'Oise (7,7 ‰) et inférieur à celui de la Picardie (8,3 ‰).

Sur la même période, 1,2 ‰ des assurés ont été remboursés pour des **neuroleptiques** (250 personnes), ce qui est légèrement moins que dans l'Oise (1,5 ‰) et qu'en Picardie (1,6 ‰).

Les consommations de **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive), de **substitution aux opiacés** (Subutex® et méthadone) et de **traitement de la dépendance à l'alcool** concernent moins de 1 ‰ des assurés de l'aire : respectivement 0,2 ‰ (54 personnes), 0,2 ‰ (49 personnes) et 0,3 ‰ (78 personnes).


Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).

→ Prévention

Une vaccination anti-grippale importante chez les 65 ans et plus


Durant la campagne de dépistage organisé du **cancer du sein** en 2005-2006, 1 399 mammographies ont été effectuées dans l'aire de Chambly, soit une participation de 39,1 % des femmes de 50-74 ans. Cette proportion est plus faible que dans l'Oise (43,8 %), qu'en Picardie (45,5 %) et qu'en France entière (47,1 %).

À l'inverse, le pourcentage de **frottis** réalisés auprès des femmes de 25-64 ans en 2006 est plus élevé dans l'aire (27,1 %, soit 1 714 frottis) que dans le département (24,2 %) et la région (20,8 %).



Dans l'aire de Chambly, 11,6 % des femmes ayant accouché entre 2000 et 2003 ont bénéficié de **moins de 7 consultations prénatales**. Cette part s'inscrit entre celles du département et de la région (10,7 % et 15,7 %).

Le pourcentage de naissances **prématurées** est équivalent dans l'aire à celui de l'Oise (5,3 %) et proche de celui de la Picardie (5,6 %).



En 2006, 66,3 % des personnes âgées de 65 ans et plus de l'aire de Chambly ont été vaccinées contre la grippe. Cette part est plus importante que dans l'Oise (62,3 %) et qu'en Picardie (64,9 %).

Les femmes sont moins vaccinées que les hommes : 65,9 % des femmes contre 67,0 % dans l'aire (62,2 % contre 62,6 % dans l'Oise et 64,2 % contre 66,1 % en Picardie).

Les personnes en ALD de moins de 65 ans sont 41,7 % à être vaccinées dans l'aire, contre 41,1 % dans l'Oise et 46,7 % en Picardie.

Les femmes sont ici plus nombreuses à se faire vacciner : 49,5 % des femmes de l'aire (41,7 % dans le département et 47,6 % dans la région) contre 37,1 % des hommes (40,6 % dans l'Oise et 46,1 % en Picardie).

En 2006, 89,7 % des enfants âgés de 2 ans de l'aire ont été vaccinés contre **la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR)**, soit un taux inférieur à celui du département (91,3 %) et proche de celui de la région (89,2 %).

Le taux de couverture vaccinale contre **la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite** est inférieur dans l'aire (90,2 %) au département (91,7 %) et à la région (91,3 %).


Concernant le **BCG**, 85,5 % des enfants de 2 ans de l'aire ont été vaccinés, ce qui est supérieur à la Picardie (84,6 %) mais inférieur à l'Oise (87,4 %).

Le vaccin contre **l'hépatite B** présente un taux de couverture vaccinale plus important que dans le département et la région : 54,3 % dans l'aire contre 51,5 % dans l'Oise et 52,7 % en Picardie.

Moins d'un tiers des enfants de 12 ans (29,9 %) de l'aire de Chambly ont **consulté un dentiste, un stomatologue et/ou un chirurgien dentiste** entre le 1^{er} août 2005 et le 31 juillet 2007, soit une part inférieure à celles de l'Oise (33,7 %) et de la Picardie (36,9 %).

Un peu moins d'un quart (23,5 %) des enfants de 12 ans ont subi une intervention, contre 24,7 % dans l'Oise et 27,4 % en Picardie. Au total, ce sont 32 enfants qui ont bénéficié de soins conservateurs, 33 de soins de chirurgie et 70 de soins d'orthodontie.

→ Graphiques polaires



Sources : DGI, ANPE-DRTEFP, Caf, MSA, Insee, Conseils généraux 02, 60 et 80, OR2S


Le rapport aire de Chambly/Picardie concernant les indicateurs socio-économiques est plutôt favorable à cette première. Le revenu moyen imposable est ainsi plus élevé dans l'aire (rapport de 1,2) tandis que les taux de chômage de longue durée et d'allocataires du RMI y sont plus bas (rapports de 0,8 et 0,4).

De même, les parts de bénéficiaires de l'aide ménagère et de l'APA à domicile sont également plus faibles (rapports de 0,8 et 0,6).

Enfin, l'aire de Chambly a une densité de logements sociaux plus faible (rapport de 0,9).

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie.

La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



Sources : Inserm CépiDc, Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR2S

La mortalité de l'aire liée aux maladies cardiovasculaires est proche du niveau picard (rapport de 1,0) mais supérieure au niveau national (rapport de 1,2). Les taux d'admissions en ALD pour ces pathologies sont supérieurs dans l'aire aux taux picard et français (rapports de 1,1 et 1,2).

Concernant les tumeurs, l'aire présente une mortalité équivalente à celle de la France métropolitaine et inférieure à la Picardie (rapport de 0,9). Les ALD associées sont plus faibles dans l'aire : rapport de 0,8 avec les deux niveaux géographiques de référence.

Les admissions en ALD toutes pathologies confondues présentent un niveau identique à ceux de la région et du pays. La mortalité générale est quant à elle proche de l'indicateur régional mais supérieure à la France métropolitaine (rapport de 1,2).

Aide à la lecture

Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.


Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

En termes de prévention, l'aire de Chambly affiche un pourcentage de frottis réalisés plus élevé que celui de la Picardie (rapport de 1,3). La situation s'inverse concernant le dépistage organisé du cancer du sein avec un rapport défavorable à l'aire (0,9).

Les taux de couverture vaccinale (anti-grippale chez les personnes âgées de 65 ans et plus et contre la rougeole, les oreillons et la rubéole chez les enfants âgés de deux ans) sont proches des taux picards.

Enfin, le niveau des consultations dentaires pour les enfants de 12 ans et le recours aux soins dentaires de ces mêmes enfants sont plus faibles dans l'aire qu'en Picardie (rapports de 0,8 et 0,9).



Graphique polaire des préventions

Sources : Aisne Preventis, Adcaso, Adema 80, PMI des Conseils généraux 02, 60, 80, Urcam, Insee, OR2S

→ Analyse et spécificité de l'aire

Spécificités de l'aire

L'aire de Chambly est une aire socialement favorisée. De fait, on note que les habitants de l'aire ont un revenu moyen (18 693 € en 2005) supérieur aux entités géographiques de référence, et notamment de la Picardie (15 938 €).

Cela se confirme au travers de différents indicateurs socio-économiques, comme par exemple les taux de RMI, de demandeurs d'emploi en fin de mois, ou les bénéficiaires des CMU de base et complémentaire où les taux sont moins élevés dans l'aire qu'en région et qu'au niveau national.

L'une des spécificités de l'aire de Chambly concerne les cancers. En effet, on note que l'aire a des taux d'admissions en ALD faibles mais des mortalités fortes pour les cancers de la prostate, du sein et des voies aérodigestives supérieures. La prévention est donc ici particulièrement importante, afin de détecter la maladie plus en amont chez le patient.

Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

→ Ce qu'il faut retenir...

L'aire de Chambly compte 446 nouveaux bénéficiaires d'une exonération du ticket modérateur au titre d'une affection de longue durée (ALD) par an entre 2004 et 2005. Ceci représente un taux de 1 846,0 nouveaux bénéficiaires pour 100 000 habitants, ce qui est inférieur aux taux de l'Oise (1 957,7), de la Picardie (1 946,5) et de la France métropolitaine (1 877,1).

L'espérance de vie à la naissance est de 74,2 ans en 2000-2004 pour les hommes de l'aire et de 82,0 ans pour les femmes.

Mortalité générale

La mortalité générale est plus forte dans l'aire (1 083,3 pour 100 000 habitants) en 2000-2004 que dans le département (1 014,9), la région (1 052,7) et qu'au niveau national (911,3).

Maladies de l'appareil circulatoire

Les maladies de l'appareil circulatoire ont entraîné plus de mortalité (327,6 pour 100 000 habitants) et d'admissions en ALD (642,4 pour 100 000) dans l'aire que dans l'Oise, la Picardie et la France métropolitaine.

Les admissions en ALD pour pathologies cardiaques graves et hypertension artérielle sévère sont plus élevées dans l'aire que dans les entités de référence.

Cancers

La mortalité par cancer est plus faible dans l'aire (251,7 décès pour 100 000 habitants) que dans l'Oise (269,0) et qu'en Picardie (277,0) mais se situe au-dessus du taux de la France métropolitaine (248,8).

Les cancers de la prostate et des voies aérodigestives supérieures présentent des taux de mortalité supérieurs à ceux des trois entités de référence.

Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Les affections psychiatriques de longue durée ont entraîné plus d'admissions en ALD dans l'aire de Chambly (154,9 pour 100 000 habitants en 2004-2005) que dans l'Oise (139,6) et qu'en Picardie (131,9) mais moins qu'en France métropolitaine (169,8).

Pour la maladie d'Alzheimer et autres démences, les admissions en ALD sont inférieures à celles du département et de la région (95,1 pour 100 000 habitants de l'aire contre 91,7 dans l'Oise et 89,5 en Picardie) mais reste supérieures à celles de la France métropolitaine (86,2).

La part des assurés du régime général remboursés pour un psychotrope est proche de celle du département (22,2 % dans l'aire contre 22,1 % dans l'Oise) et inférieure à celle de la région (24,1 %).

Prévention

Dépistages : le dépistage organisé du cancer du sein est plus faible dans l'aire (39,1 % de femmes entre 50 et 74 ans dépistées) qu'au niveau départemental (43,8 %), régional (45,5 %) et qu'en France entière (47,1 %).

Périnatalité : le pourcentage de femmes ayant accouché entre 2000 et 2003 et ayant bénéficié de moins de 7 consultations prénatales (11,6 %) est plus élevé que celui du département (10,7 %) mais reste inférieur à celui de la région (15,7 %).

Vaccination : les vaccinations anti-grippales (chez les 65 ans et plus ou les personnes en ALD) sont bien suivies par rapport aux moyennes du département et de la région. Quant aux vaccinations infantiles, l'aire a des taux supérieurs à la Picardie pour le BCG et l'hépatite B et inférieur pour le DTCP. La vaccination ROR dans l'aire est à un niveau équivalent à la région.

Actes dentaires : la consultation de dentistes par des enfants de 12 ans est plus faible dans l'aire (29,9 %) que dans l'Oise (33,7 %) et qu'en Picardie (36,9 %). Une part également plus faible d'enfants a eu recours à des soins dentaires.

Remerciements à la Drass de Picardie,
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en janvier 2009
Il a été rédigé et mis en page par Hubert Leroi, Anne Ducamp, Alexandra Fourquier,
Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),
et Danielle Fontaine (DRSM).