

Regard santé

l'aire de Crépy-en-Valois



→ Présentation de l'aire

L'aire de Crépy-en-Valois comprend **un seul canton** éponyme.

Au 1^{er} janvier 2006, cette aire compte 29 955 habitants, soit une densité de 125,7 habitants au km². Cette densité est inférieure à celle de l'Oise (135,3 h/km²) mais supérieure à celles de la Picardie (97,6 h/km²) et de la France métropolitaine (112,9 h/km²).

Cette aire compte proportionnellement autant de personnes de **moins de 25 ans** que dans le département (respectivement 34,5 % et 34,0 %) et davantage que la région (33,1%) et que le niveau national (30,9 %).


De même, la proportion de **75 ans et plus** est plus élevée dans l'aire (5,8 %) et proche de celle de l'Oise (5,5 %). Elle est inférieure à celles de la Picardie (6,6 %) et de la France métropolitaine (7,7 %).

En 2003-2006, l'aire de Crépy-en-Valois présente un **indice conjoncturel de fécondité** (ICF) de 1,98 enfant par femme, ce qui est plus faible que dans l'Oise (2,07) et la Picardie (2,00) mais plus élevé qu'en France métropolitaine (1,90).

En tout, ce sont 1 533 naissances domiciliées entre 2003 et 2006, dont 11,1 pour 1 000 sont le fait de **mères mineures** (contre 7,6 % dans l'Oise, 9,6 % en Picardie et 5,6 % en France métropolitaine).

Entre 2001 et 2004, les 1 564 naissances dont les parents résident dans l'aire se sont passées à Compiègne pour 65,7 % d'entre elles et pour 21,8 % à Senlis.

Près de la moitié des décès d'habitants de l'aire (49,3 %) est survenue dans l'aire. Les cantons de Compiègne et de Senlis regroupent respectivement 30,3 % et 9,0 % des décès domiciliés. Enfin, 11,4 % des décès domiciliés ont été enregistrés dans le reste de la France.



SOMMAIRE

PAGE 2 Données sociales

PAGE 3 Professionnels de santé

PAGE 4 Mortalité et affections de longue durée

PAGE 5 Maladies de l'appareil circulatoire

PAGE 6 Cancers et tumeurs

PAGE 7 Asthme

PAGE 8 Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

PAGE 9 Prévention

PAGE 10 Graphiques polaires

PAGE 11 Analyse et spécificité de l'aire

PAGE 12 Ce qu'il faut retenir...



OR2S



Assurance
Maladie

Service Médical
Nord Pas-de-Calais Picardie

→ Données sociales

Un revenu moyen élevé et peu de bénéficiaires de l'aide ménagère et de l'APA à domicile

En 2005, 41,4 % des foyers fiscaux de l'aire sont **non imposables**, ce qui est moins que dans l'Oise (42,5 %), la Picardie (47,8 %) et la France (46,2 %).

Les habitants de l'aire ont un **revenu moyen** de 17 677 € en 2005, ce qui est supérieur à l'Oise (17 447 €), à la Picardie (15 938 €) et la France (17 165 €).

Crépy-en-Valois compte 16,4 bénéficiaires de l'**aide ménagère** pour 1 000 personnes de 65 ans et plus en 2004, ce qui est inférieur aux moyennes de référence (20,7 ‰ dans l'Oise et 21,3 ‰ en Picardie).

De même, l'aire compte moins de bénéficiaires de l'**allocation personnalisée d'autonomie (APA)** à domicile parmi les 75 ans et plus (54,5 bénéficiaires pour 1 000 personnes de 75 ans et plus) en 2005 que l'Oise (72,7 ‰), la Picardie (117,7 ‰) et la France métropolitaine (149,4 ‰).

En 2004, l'aire de Crépy-en-Valois compte 1 102 **demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM)** de catégorie 1.


Parmi les DEFM, 25,5 % ont moins de 25 ans, soit davantage que dans l'Oise (23,5 %) et en Picardie (24,8 %). De même, la part des 50 ans et plus élevée dans l'aire (14,9 %) que dans l'Oise (14,3 %) et dans la région (13,6 %).

En outre, la proportion de DEFM de plus d'un an d'ancienneté est faible : 24,7 % des DEFM de catégorie 1 de l'aire contre 30,6 % dans l'Oise et 33,9 % en Picardie.

L'aire compte nettement moins d'allocataires du **revenu minimum d'insertion (RMI)** que les autres entités géographiques : 18,6 allocataires pour 1 000 ménages en 2004 contre 36,8 ‰ dans l'Oise, 42,3 ‰ en Picardie et 41,9 ‰ en France métropolitaine.


Les taux d'allocataires du RMI pour des familles monoparentales ou des couples sont plus bas dans l'aire (respectivement 62,8 pour 1 000 familles monoparentales en 2004 et 4,0 pour 1 000 couples) que dans l'Oise (116,9 ‰ et 11,2 ‰) et la Picardie (133,4 ‰ et 14,5 ‰).

De même, le taux de Rmistes parmi les 25-49 ans est de 14,3 % dans l'aire contre 26,6 % dans l'Oise et 33,4 % en Picardie.



Sources : Conseils généraux 02, 60 et 80, Insee, OR2S

2



Sources : Cpam, MSA, RSI, Insee, OR2S

La **CMU de base** concerne nettement moins de personnes dans l'aire étudiée (3,8 bénéficiaires pour 1 000 habitants en 2005) que dans l'Oise (13,6 ‰) et la Picardie.

Pour la **CMU complémentaire**, l'aire compte 25,9 bénéficiaires pour 1 000 habitants en 2005 contre 70,7 ‰ dans l'Oise et 89,6 ‰ en Picardie.

→ Professionnels de santé

Une densité en médecins généralistes assez faible

En novembre 2006, l'aire de Crépy-en-Valois compte 21 **médecins généralistes**, soit une densité de 6,8 généralistes pour 10 000 habitants. Cette densité est plus faible que celles de l'Oise (8,6), de la Picardie (9,7) et de la France métropolitaine (11,2).

Parmi les généralistes de l'aire, 23,8 % sont des femmes, ce qui est moins élevé que dans le département (30,5 %), la région (27,6 %) et au niveau national (29,4 %).

La moyenne d'âge de ces généralistes est de 46,6 ans. Cette moyenne est inférieure à celles de l'Oise (49,6 ans), de la Picardie (49,4 ans) et de la France métropolitaine (49,8 ans).

Quatre d'entre eux ont par ailleurs 55 ans et plus, soit 19,0 % de l'effectif de l'aire (31,6 % dans l'Oise, 31,5 % en région et 32,3 % en métropole).

L'aire compte 16 **médecins spécialistes** libéraux ou mixtes en novembre 2006, soit une densité de 5,2 spécialistes pour 10 000 habitants. L'Oise et la Picardie présentent la même densité (5,2), inférieure à la densité nationale (8,8).

Au 31 décembre 2007, 13 **chirurgiens dentistes** sont installés dans l'aire de Crépy-en-Valois, soit une densité de 4,2 chirurgiens dentistes libéraux et mixtes pour 10 000 habitants de l'aire contre 4,0 dans l'Oise et la Picardie et 6,2 en France métropolitaine.

La moyenne d'âge des dentistes de l'aire est de 48,9 ans, 4 d'entre eux ont 55 ans et plus. Parmi ces 13 dentistes, 3 sont des femmes.

Les **auxiliaires médicaux** (infirmiers, kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes) sont 37 dans l'aire en avril 2007. La densité est de 12,0 auxiliaires médicaux (libéraux et mixtes) pour 10 000 habitants, ce qui est équivalent à l'Oise (11,8) mais inférieur à la région (13,8) et au niveau national (21,9).

Une grande partie des auxiliaires médicaux de l'aire sont des femmes (73,0 %), ce qui est plus important que dans les autres entités géographiques (71,0 % en Picardie, 69,7 % dans l'Oise et 69,0 % en France métropolitaine).


La moyenne d'âge est de 43,0 ans (contre 43,5 ans dans l'Oise, 43,4 ans pour la Picardie et 43,6 ans pour la France métropolitaine) ; et seuls 5 auxiliaires médicaux ont 55 ans et plus.

L'aire de Crépy-en-Valois a une densité de 6,2 **infirmiers** libéraux et mixtes pour 10 000 habitants en avril 2007 (soit 19 infirmiers), ce qui est au-dessus de l'Oise (5,5), mais en dessous de la Picardie (7,1) et de la France métropolitaine (11,2).


La grande majorité des infirmiers sont des femmes : 89,5 % dans l'aire pour 87,9 % dans l'Oise, 88,5 % en Picardie et 84,6 % en France métropolitaine.

La moyenne d'âge est de 45,1 ans (44,1 ans dans l'Oise, 44,6 ans en Picardie et 44,9 ans au niveau national) et seuls 3 des 19 infirmiers ont 55 ans et plus.

On recense 7 **pharmacies** sur l'aire en 2004, soit une densité de 2,3 pharmacies pour 10 000 habitants. Cette densité est plus faible que dans l'Oise (3,1) et la Picardie (3,3).



Sources : Adeli, Insee, OR2S



Sources : Adeli, OR2S

Entre le 1^{er} juillet 2005 et le 30 juin 2006, 69,9 % des patients ayant consulté un médecin généraliste l'ont fait au sein de l'aire.


Pour ce qui est des visites chez un ophtalmologue, 36,5 % des visites s'effectuent dans l'aire et 31,5 % dans le canton de Compiègne. Inversement, 47,8 % des consultations de gynécologue obstétricien se font dans le canton de Compiègne et 18,2 % dans l'aire de Crépy-en-Valois. Pour les gynécologues médicaux, 67,7 % des visites ont lieu dans le canton de Compiègne et aucune dans l'aire. Enfin, 47,1 % des consultations chez un dermatologue se passent dans l'aire de Crépy-en-Valois et 25,8 % dans le canton de Compiègne.

→ Mortalité et ALD

Une mortalité générale plus élevée que dans les autres entités géographiques

En 2000-2004, l'**espérance de vie** à la naissance dans l'aire de Crépy-en-Valois est de 75,0 ans pour les hommes et de 81,2 ans pour les femmes contre 74,8 ans pour les hommes et 82,0 ans pour les femmes dans l'Oise et 74,1 ans et 81,7 ans dans la région.

Par rapport aux Français, les hommes de Crépy-en-Valois ont 0,9 an de vie de moins en moyenne. Les femmes ont un écart plus grand que les hommes avec la France métropolitaine : 2 ans.



En 2000-2004, l'aire de Crépy-en-Valois enregistre un taux de **mortalité générale** de 1 100,3 pour 100 000 habitants, soit 261 décès par an. Cette mortalité est plus forte que dans l'Oise (1 014,9), la Picardie (1 052,7) et surtout que la France métropolitaine (911,3).

En revanche, la **mortalité prématurée** (survenant avant 65 ans) est plus faible dans l'aire (218,7 pour 100 000) que dans l'Oise (243,2) et la Picardie (262,7) mais proche du taux métropolitain (221,5).

Plus de la moitié (57,6 %) des décès survenant dans l'aire de Crépy-en-Valois en 2000-2004 sont le fait de tumeurs et de maladies de l'appareil circulatoire (58,7 % des décès masculins et 56,5 % des décès féminins).

Les hommes sont davantage touchés par les **tumeurs** (33,3 % des décès masculins et 23,1 % des décès féminins) tandis que les femmes sont plus concernées par les maladies de l'**appareil circulatoire** (33,4 % des décès féminins et 25,4 % des décès masculins).

La troisième cause de mortalité est identique entre les hommes et les femmes. Il s'agit des maladies de l'**appareil respiratoire** qui comptent pour 8,8 % des décès masculins et 7,0 % de l'ensemble des décès féminins.

L'aire de Crépy-en-Valois affiche un taux de mortalité par **suicide** plus faible qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (respectivement 17,3 pour 100 000 contre 23,1 en Picardie et 18,0 en France métropolitaine).

Les **accidents de la circulation** engendrent une mortalité supérieure aux taux régional et national (16,1 pour 100 000 contre respectivement 14,3 et 10,8).

En 2004-2005, 8 164 **séjours hospitaliers** par an ont été comptabilisés pour les habitants de l'aire étudiée, soit un taux de 281,8 séjours pour 1 000 habitants (contre 299,9 % dans l'Oise et 289,3 % en Picardie).

Concernant les nouvelles **admissions en affections de longue durée** (ALD) en 2004-2005, les tumeurs et le diabète sont les deux principales pathologies avancées, pour les femmes comme pour les hommes. À eux deux, ils totalisent 37,8 % des nouvelles admissions.

Le **diabète** fait partie des maladies qui induisent à terme d'autres affections telles que les maladies cardiovasculaires, neurologiques, ophtalmologiques et/ou rénales. Une étude met en évidence une non prise en charge en ALD d'environ un cas sur quatre.

Le taux de bénéficiaires d'ALD de l'aire pour diabète (85 nouveaux cas annuels entre 2004 et 2005, soit un taux de 321,0 pour 100 000 habitants) est supérieur à ceux de l'Oise (308,2), de la Picardie (311,4) et de la France métropolitaine (266,5).

	Femmes			Hommes		
	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Femmes	Nombre annuel de nouvelles admissions en ALD	Poids des nouvelles admissions (en %)	Classement Hommes
Tumeurs malignes	50	21,3	1	61	21,5	1
Diabète	41	17,7	2	44	15,4	2
Hypertension artérielle sévère	29	12,2	3	25	8,7	5
Affections psychiatriques de longue durée	19	8,3	4	19	6,8	6
Pathologies cardiaques graves	17	7,3	5	25	8,8	4
Maladie d'Alzheimer et autres démences	11	4,6	6	6	2,0	11
Accident vasculaire cérébral	8	3,6	7	10	3,4	9
Maladie coronaire	8	3,5	8	31	11,1	3
Artériopathies chroniques	7	2,8	9	14	4,9	7
Insuffisance respiratoire chronique	6	2,7	10	11	3,9	8
Forme grave des affections neurologiques	5	2,1	11	6	2,3	10
Autres causes de nouvelles admissions	33	13,9	-	32	11,3	-
Total	234	100		283	100	

Principales causes de nouvelles admissions en ALD dans l'aire en nombre et en pourcentage de l'ensemble, par sexe, en 2004-2005

Sources : Cnamts, CCMSA, RSI, Insee, OR2S

→ Maladies de l'appareil circulatoire

Des admissions en ALD élevées pour les accidents vasculaires cérébraux et l'hypertension artérielle

Les **maladies de l'appareil circulatoire** ont entraîné annuellement, entre 2004 et 2005, 173 nouvelles admissions en affections de longue durée (ALD) se répartissant en 104 admissions pour les hommes et 69 pour les femmes.

En 2004-2005, 618 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an sont le fait de maladies cardiovasculaires (en diagnostic principal et relié), soit un taux de 23,1 pour 1 000 habitants (27,3 ‰ dans l'Oise et 27,8 ‰ en Picardie).

La mortalité de l'aire de Crépy-en-Valois pour ces pathologies est de 340,0 pour 100 000 en 2000-2004 (77 décès par an), ce qui est plus élevé que dans l'Oise (297,8), la Picardie (314,2) et la France métropolitaine (271,8).


Les **cardiopathies ischémiques** ont entraîné, en 2004-2005, 140 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an, ce qui représente un taux de 5,2 pour 1 000 (6,0 ‰ dans l'Oise et 6,1 ‰ en Picardie).

Parmi les maladies de l'appareil circulatoire, la mortalité par cardiopathies ischémiques (20 décès annuels) est de 86,5 des décès pour 100 000 dans l'aire, soit un taux proche de la moyenne régionale (86,6 ‰). Elle est plus importante que dans l'Oise (82,5) et la France métropolitaine (74,6).

Annuellement, entre 2004 et 2005, 18 personnes de l'aire de Crépy-en-Valois ont bénéficié d'une admission en ALD suite à un **accident vasculaire cérébral** (10 hommes et 8 femmes). Le taux de bénéficiaires de l'ALD dans l'aire (69,9 pour 100 000) est plus élevé que dans l'Oise (57,4), la région (56,1) et le niveau national (60,5).

En 2004-2005, 73 séjours hospitaliers d'habitants de l'aire par an sont liés à des maladies cérébrovasculaires, soit un taux de séjour de 2,8 pour 1 000. Ce taux est moins important que le taux isarien (3,3 ‰) mais égal au taux picard (2,8 ‰).

La mortalité par maladies vasculaires cérébrales (20 décès annuellement entre 2000 et 2004, soit un taux de mortalité de 84,8 pour 100 000) est supérieure à celles de l'Oise (67,5), de la Picardie (69,6) et de la France métropolitaine (63,4).



Les **pathologies cardiaques graves** ont suscité 42 nouvelles admissions en ALD annuelles entre 2004 et 2005 (25 hommes et 17 femmes).

En taux, cela représente 169,9 bénéficiaires de l'ALD pour 100 000 habitants en 2004-2005, ce qui est plus important que dans les autres entités géographiques.

Pour les **maladies coronaires** (148,7 pour 100 000), le taux est proche de ceux de l'Oise (147,1) et de la Picardie (150,0).

Ce sont 39 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005 (31 hommes et 8 femmes).

La prise en charge en affection de longue durée pour **hypertension artérielle sévère** (213,5 pour 100 000) est également plus élevée que dans les autres entités géographiques (203,9 dans l'Oise, 164,4 en Picardie et 170,2 en France métropolitaine).

Annuellement, en 2004-2005, les nouveaux admis en ALD pour HTA sévère sont 54 dans l'aire, dont 25 hommes et 29 femmes.

Le nombre de nouveaux bénéficiaires de cette ALD est inférieur à la morbidité réelle car cette pathologie est souvent ignorée, ou non déclarée si le patient bénéficie déjà d'une exonération du ticket modérateur pour une autre affection de longue durée.


→ Cancers et tumeurs

Des taux d'admissions en ALD faibles mais des mortalités fortes pour les cancers de la prostate, du sein et du côlon-rectum

L'aire de Crépy-en-Valois présente un taux de 416,2 nouveaux bénéficiaires de l'ALD pour **tumeurs malignes** en 2004-2005 pour 100 000 habitants (soit 111 personnes en moyenne chaque année), ce qui est moins élevé que dans l'Oise (482,4), la Picardie (497,8) et la France métropolitaine (483,1).

En 2004-2005, 660 séjours hospitaliers par an sont liés à cette cause en diagnostic principal et relié pour des habitants de l'aire, soit un taux de 23,9 ‰ (26,9 dans l'Oise et 24,3 en Picardie).

En termes de mortalité par tumeurs, l'aire a un taux de 294,8 pour 100 000 habitants en 2000-2004, soit 73 décès par an (contre 278,7 dans l'Oise, 286,6 en région et 257,8 au national).




Concernant le **cancer de la prostate**, le taux de nouveaux bénéficiaires de l'ALD (165,0 pour 100 000) est inférieur aux indicateurs de référence 203,9 dans l'Oise, 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine). L'écart se maintient après 65 ans avec un taux de 695,7 contre respectivement 963,1 dans le département, 969,5 en région et 915,3 au niveau national.

Au total, ce sont 18 nouveaux admis annuellement en 2004-2005, dont 11 ont 65 ans et plus.

Par ailleurs, le taux de séjours hospitaliers pour cancer de la prostate est de 2,9 ‰ en 2004-2005 (33 séjours) contre 3,9 ‰ dans l'Oise et en Picardie.

La mortalité par cancer de la prostate (5 décès annuels) est plus forte dans l'aire de Crépy-en-Valois (65,9 pour 100 000) que dans l'Oise (50,2), la Picardie (53,8) et la France métropolitaine (45,1).



En 2004-2005, 18 femmes (dont 13 de moins de 65 ans) de l'aire de Crépy-en-Valois ont bénéficié annuellement pour la première fois d'une prise en charge ALD au titre d'un **cancer du sein**.


Proportionnellement, l'aire présente un taux de bénéficiaires inférieur aux autres entités géographiques (128,8 pour 100 000 contre 169,8 dans l'Oise, 172,6 en Picardie et 175,3 en France métropolitaine).

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer du sein est de 4,2 séjours pour 1 000 habitantes de l'aire, ce qui est proche des taux du département (4,9 ‰) et de la région (4,4 ‰).

La mortalité est de 43,2 pour 100 000, soit un taux élevé qu'ailleurs : 36,6 dans l'Oise, 37,3 en Picardie et 33,2 au niveau national. Ces cancers représentent 6 décès par an entre 2000 et 2004.

La prévention est donc ici particulièrement importante. Le dépistage organisé vise à toucher l'ensemble de la population féminine de 50-74 ans afin de diminuer la mortalité.

→ Cancers et tumeurs



Sources : Inserm CépiDc, Insee, OR2S

En termes d'admissions en ALD, le **cancer colorectal** représente par an 8 nouveaux bénéficiaires en 2004-2005 dans l'aire de Crépy-en-Valois (5 hommes et 3 femmes), soit un taux de 30,0 pour 100 000, ce qui est inférieur aux autres entités géographiques (45,8 dans l'Oise, 46,8 en Picardie et 48,4 en France métropolitaine).

Le taux de séjours hospitaliers pour cancer colorectal est proche des taux du département et de la région : 2,1 ‰ dans l'aire (soit 57 séjours, dont 23 hommes) contre 2,5 ‰ dans l'Oise et 2,3 ‰ pour la Picardie.

La mortalité par cancer colorectal est plus importante dans l'aire de Crépy-en-Valois (35,5 pour 100 000 en 2000-2004, soit 9 décès par an) que dans l'Oise (26,1), la région (28,9) et au niveau national (27,8).

Après le cancer du sein, le cancer colorectal est la deuxième principale cause de décès par tumeur maligne chez les femmes (5 décès annuels entre 2000 et 2004) avec un taux de 32,6 pour 100 000.

Pour les **cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS)**, on dénombre 30 séjours hospitaliers par an (dont 26 concernant des hommes) en 2004-2005. Ceci représente un taux de séjour de 1,0 ‰ (1,5 ‰ dans l'Oise et en Picardie).

L'aire a un taux de mortalité (14,0 pour 100 000) moins élevé que dans les autres entités géographiques (20,3 dans l'Oise, 22,2 en Picardie et 17,3 en France métropolitaine). En 2000-2004, il s'agit de 4 décès par an liés à cette cause.

Concernant les séjours hospitaliers en 2004-2005 pour **cancer de la trachée, des bronches et du poumon**, 131 ont été dénombrés par an (dont 105 chez les hommes), soit un taux de 4,8 ‰ (3,3 ‰ dans l'Oise et 2,8 ‰ en Picardie).

La mortalité dans l'aire de Crépy-en-Valois (13 décès par an entre 2000 et 2004) devance toutes les autres entités géographiques pour ce cancer : 51,0 pour 100 000 contre 49,0 dans le département, 50,0 en région et 44,0 au niveau national.

→ Asthme

En 2006, 1 875 assurés du régime général ont **reçu un traitement contre l'asthme*** (1 010 femmes et 865 hommes), quelle que soit la sévérité de l'asthme, soit **8,1 % des assurés** de l'aire de Crépy-en-Valois. Ce taux est inférieur à celui de l'Oise (9,5 %) et de la Picardie (10,3 %). Les taux féminins et masculins sont proches dans l'aire : 8,4 % des femmes et 8,0 % des hommes.

Les 0-12 ans sont 9,7 % à avoir reçu un traitement pour cette pathologie dans l'aire de Crépy-en-Valois, soit 404 jeunes en 2006. Ce taux est inférieur aux taux départemental (11,5 %) et régional (12,0 %). Les filles de l'aire sont moins concernées que les garçons : 8,5 % des filles (9,7 % dans l'Oise et 10,1 % en Picardie) contre 10,8 % des garçons (13,3 % et 13,9 %).

* Certains médicaments pris en compte peuvent aussi avoir été prescrits pour des bronchites chroniques, surtout chez les personnes âgées.

→ Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

Un faible taux d'admission en ALD pour les maladies d'Alzheimer et autres démences



Le taux d'ALD pour **affections psychiatriques** de Crépy-en-Valois (134,8 pour 100 000 personnes, soit 39 nouvelles admissions par an entre 2004 et 2005) est au-dessus de celui de la Picardie (131,9), mais inférieur à ceux de l'Oise (139,6) et de la France métropolitaine (169,8).

En 2004-2005, 125 séjours hospitaliers par an pour troubles mentaux et comportementaux d'habitants de l'aire ont été dénombrés, soit un taux de 4,2 ‰ (10,4 ‰ dans l'Oise et 7,5 ‰ pour la Picardie).

Concernant la **maladie d'Alzheimer** et autres démences (17 nouvelles admissions annuelles en 2004-2005, dont 11 femmes), l'aire de Crépy-en-Valois a un taux plus faible (75,4 pour 100 000) que ceux du département et de la région (respectivement 91,7 et 89,5).

En 2006, 1,9 % des personnes de 70 ans et plus du régime général ont eu une **prescription de médicaments anti-Alzheimer** dans l'aire étudiée en prescription délivrée en ville contre 2,6 % dans l'Oise et 2,8 % en Picardie.

Les femmes ont des taux plus élevés que les hommes : 2,2 % des femmes de 70 ans et plus du régime général contre 1,5 % des hommes de l'aire (respectivement 2,9 % et 2,0 % dans l'Oise et 3,2 % et 2,1 % en Picardie).



En 2006, 22,0 % des assurés sociaux ont été **remboursés au moins une fois pour un psychotrope** (27,4 % des femmes et 16,0 % des hommes). Cette proportion est identique à celle de l'Oise (22,1 %), mais inférieure à celle de la Picardie (24,1 %). Elle correspond à 4 823 personnes.

Les **anxiolytiques** sont la classe la plus remboursée. Pour cette classe la proportion d'assurés remboursés au moins une fois en 2006 est de 14,5 % (18,6 % des femmes et 10,0 % des hommes). Cette proportion est moins importante que pour l'Oise (15,0 %) ou la Picardie (16,4 %).

En tout, 3 197 personnes sont remboursées pour un anxiolytique en 2006.

La consommation d'**antidépresseur** concerne 8,8 % des assurés de l'aire (12,0 % des femmes et 5,1 % des hommes, soit 1 946 personnes) contre 7,7 % dans l'Oise et 8,3 % en Picardie.

Pour les **neuroleptiques**, la proportion de personnes remboursées au moins une fois en 2006 est de 1,5 % (316 personnes), tout proche des moyennes du département (1,5 %) et de la région (1,6 %).

Les consommations de **normothymiques** (traitement de la psychose maniaco-dépressive), de **substitution aux opiacés** (Subutex® et méthadone) et de **traitement de la dépendance à l'alcool** concernent moins de 1 % des assurés de l'aire : respectivement 0,3 % (61 personnes), 0,2 % (56 personnes) et 0,3 % (67 personnes).

Ces chiffres de consommation de médicaments sont liés à la fréquence de la maladie correspondante dans la population, à la tendance des personnes à consulter et à la couverture médicale. Ils dépendent aussi de la façon dont les médecins prennent en charge certaines pathologies où la prescription de médicaments n'est qu'une des possibilités (anxiété notamment).


→ Prévention

Un faible taux de dépistage du cancer du sein

Durant la campagne de dépistage organisé du **cancer du sein** de 2005-2006, 1 489 mammographies ont été effectuées dans l'aire de Crépy-en-Valois, soit une participation de 39,1 % des femmes de 50-74 ans de l'aire.


Cette participation est assez faible au regard des chiffres enregistrés dans l'Oise (43,8 %), la Picardie (45,5 %) et la France métropolitaine (47,1 %).

En 2006, 1 602 **frottis** ont été effectués sur des femmes de 25-64 ans de l'aire de Crépy-en-Valois. Ceci représente un taux de dépistage de 24,4 %, ce qui est proche du taux isarien (24,2 %) et plus élevé que le taux national (20,8 %).



Dans l'aire de Crépy-en-Valois, 10,3 % des femmes ayant accouché ont bénéficié de **moins de 7 consultations prénatales** en 2000-2003. Ce pourcentage est plus faible que dans l'Oise (10,7 %) et la Picardie (15,7 %).

Le pourcentage de **prématurés** en 2000-2003 est également plus faible dans l'aire (5,1 %) que dans le département (5,3 %) et la région (5,6 %).



En 2006, 61,9 % des personnes de 65 ans et plus de l'aire de Crépy-en-Valois sont **vaccinées contre la grippe**. Ce taux est moins élevé que dans le département (62,3 %) et la région (64,9 %).

Les femmes sont moins vaccinées que les hommes : 60,3 % des femmes de 65 ans et plus contre 64,3 % des hommes.

Cette même année, les personnes en ALD âgées de moins de 65 ans sont 38,7 % à être vaccinées dans l'aire, avec une proportion toujours plus importante chez les hommes : 41,6 % des hommes contre 34,6 % des femmes en ALD.

Les personnes en ALD de l'aire sont moins vaccinées que celles de l'Oise (41,1 %) et de la Picardie (46,7 %).

En 2006, 86,1 % des enfants de deux ans ont été vaccinés contre **la rougeole, les oreillons et la rubéole**, soit moins que l'Oise (91,3 %) et la Picardie (89,2 %).

Concernant le **BCG**, l'aire a un taux de vaccination de 85,7 % pour les enfants de deux ans, ce qui est moins que dans l'Oise (87,4 %), mais plus qu'en Picardie (84,6 %).


Le taux de vaccination passe à 93,6 % pour **la diphtérie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite**. Ce taux est supérieur à ceux de l'Oise (91,7 %) et de la Picardie (91,3 %).

Enfin, la vaccination contre l'**hépatite B** est très peu pratiquée dans l'aire : 39,5 % des enfants de deux ans en 2006 contre 51,5 % dans l'Oise et 52,7 % en Picardie.

Les enfants nés entre le 1^{er} août 1993 et le 31 juillet 1994 de l'aire de Crépy-en-Valois sont 41,1 % à avoir **consulté un dentiste, un chirurgien dentiste et/ ou un stomatologue** l'année de leur 12 ans. Cette proportion est plus élevée que dans le département (33,7 %) et la région (36,9 %).

Ils sont 33,3 % à avoir subi une intervention (24,7 % dans l'Oise et 27,4 % en Picardie) : 56 enfants ont eu des soins conservateurs (obturation, attelle métallique, scellement prophylactique), 36 des actes de chirurgie et 80 des soins d'orthodontie.

→ Graphiques polaires



Sources : DGI, ANPE-DRTEFP, Caf, MSA, Insee, Conseils généraux 02, 60 et 80, OR25

La population de Crépy-en-Valois dispose d'un revenu moyen supérieur à celui des Picards.


Le taux d'allocataires du RMI dans l'aire y est beaucoup moins important (rapport de 0,4) qu'en région, tout comme la part de chômeurs de longue durée (rapport de 0,7).

La densité de logements sociaux est également moins importante dans l'aire qu'en Picardie (rapport de 0,8).

Enfin, la tendance est similaire concernant l'aide ménagère et l'APA à domicile. De fait, l'aire présente un taux d'APA à domicile inférieur à la moyenne picarde (rapport de 0,5), ainsi qu'un taux de bénéficiaires d'aide ménagère moins élevé (rapport de 0,8).

La morbidité est décrite par la prise en charge en affection de longue durée (ALD). Cette prise en charge est sollicitée par le médecin et le patient auprès du médecin conseil afin de bénéficier d'un remboursement à 100 % pour les soins en rapport avec la pathologie.

La mortalité est mise ici en relation avec les ALD.



Sources : Inserm CépiDc, Cnamts, MSA, RSI, Insee, OR25

La mortalité liée à l'appareil cardiovasculaire est plus importante à Crépy-en-Valois qu'aux niveaux de la Picardie et de la France métropolitaine.

Le nombre d'ALD pour cette pathologie y est aussi plus important.

Les ALD pour tumeurs par contre, sont moins importantes dans l'aire que dans les autres entités géographiques, contrairement à la mortalité qui est légèrement plus forte dans l'aire qu'en région et qu'au niveau national.

Le taux pour l'ensemble des ALD dans l'aire est sensiblement plus élevé qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine, tout comme la mortalité générale de l'aire.

Aide à la lecture

Ces graphiques polaires ont pour but de résumer les disparités de l'aire par la mise en évidence d'indicateurs dans les domaines du social, de la morbidité et de la mortalité, ainsi que dans le domaine de la prévention.


Chaque graphique intègre six indicateurs. Chaque indicateur est le rapport entre le taux de l'aire étudiée et celui de la région, noté par un trait vert. Le trait bleu correspond au rapport entre le taux de l'aire et celui de la France métropolitaine.

Ainsi, lorsque le rapport est supérieur à 1, le taux décrit dans l'aire est supérieur à celui de la région ou du pays. S'il est inférieur à 1, il est plus faible dans l'aire que dans la région ou le pays.

Le taux de dépistage du cancer du sein est inférieur à celui de la Picardie (rapport de 0,9), contrairement à celui du cancer du col d'utérus, plus important dans l'aire qu'en région (rapport de 1,2).

En ce qui concerne la vaccination ROR, l'aire de Crépy-en-Valois est moins concernée que la Picardie, ce qui est également le cas pour les vaccinations contre la grippe chez les 65 ans et plus.

Les consultations chez le dentiste (1,1) ainsi que les soins dentaires (1,2) réalisés par les habitants de l'aire sont plus importants qu'en Picardie.



→ Analyse et spécificités de l'aire

Spécificités de l'aire

L'aire de Crépy-en-Valois est une aire socialement favorisée, de fait, on note que les habitants de l'aire ont un revenu moyen de 17 677 € en 2005, ce qui est supérieur aux autres entités géographiques et notamment celle de la Picardie (15 938 €).

Cela se confirme au travers de différents indicateurs socio-économiques : les taux de RMI ou de bénéficiaires des CMU de base et complémentaire sont moins nombreux dans l'aire de Crépy-en-Valois qu'en région et qu'au niveau national.

L'une des spécificités de l'aire de Crépy-en-Valois concerne les cancers. L'aire a des taux d'admissions en ALD faibles mais des mortalités fortes pour les cancers de la prostate, du sein et du côlon-rectum ; la prévention est donc ici particulièrement importante.

Définition des aires Urcam

Afin de déterminer les aires Urcam, il était nécessaire, dans un premier temps, de comparer les profils de recours sanitaire de la population de chaque canton picard (analyse en composantes principales) et, dans un second temps, de déterminer des aires de santé ayant une population avec des profils comparables (classification ascendante hiérarchique).

Trois sources de données ont été utilisées : les données fournies par le CépiDc de l'Inserm concernant les décès survenus dans les établissements de santé ; les données de l'état civil pour les naissances ; les données fournies par l'Urcam de Picardie concernant les consommations de santé (consultations de généralistes et de spécialistes, dépenses de pharmacie).

→ Ce qu'il faut retenir...

En 2004-2005, on compte annuellement 517 bénéficiaires d'une ALD (affection de longue durée), soit 1 973,3 bénéficiaires pour 100 000 habitants de l'aire. Cette proportion est supérieure à celles observées dans l'Oise (1 957,7), en région (1 946,5) et au niveau national (1 877,1).

En 2000-2004, l'espérance de vie à la naissance est de 75,0 ans pour les hommes et 81,2 ans pour les femmes.

Mortalité générale

En 2000-2004, l'aire de Crépy-en-Valois enregistre une mortalité générale (1 100,3 pour 100 000 habitants) plus forte qu'en Picardie (1 052,7) et surtout qu'en France métropolitaine (911,3).

Maladies de l'appareil circulatoire

Ces maladies ont entraîné un taux de mortalité (340,0 pour 100 000) plus fort qu'en Picardie et qu'en France métropolitaine (314,2 et 271,8) en 2000-2004.

Plus précisément, la mortalité par accident vasculaire cérébral (84,8 contre 69,6 en Picardie et 63,4 en France métropolitaine) et le taux de nouveaux bénéficiaires de l'ALD au titre d'une pathologie cardiaque grave (169,9 pour 100 000 en 2004-2005 contre respectivement 149,7 et 140,1) sont plus élevés qu'en région et qu'au niveau national.

Cancers

Les tumeurs (294,8) provoquent une mortalité plus importante dans l'aire que dans la région (286,6) et le niveau national (257,8).

Le cancer de la prostate a entraîné l'admission de 18 nouveaux bénéficiaires annuels de l'ALD entre 2004 et 2005, soit un taux de 165,0 pour 100 000 contre 209,5 en Picardie et 198,0 en France métropolitaine. La mortalité est par contre plus forte dans l'aire (65,9 pour 100 000) qu'en région et au niveau national.

De même, le cancer colorectal et le cancer du sein ont tous les deux un taux de nouveaux bénéficiaires de l'ALD plus faible que la Picardie et la France métropolitaine mais une mortalité plus forte. Le cancer colorectal présente un taux de nouveaux bénéficiaires de l'ALD de 30,0 pour 100 000 (contre 46,8 et 48,4) et une mortalité de 35,5 (contre 28,9 et 27,8).

Pour le cancer du sein, le taux d'ALD est de 128,8 pour 100 000 (contre 172,6 et 175,3) et celui de mortalité de 43,2 (contre 37,3 et 33,2).

Maladies du système nerveux et affections psychiatriques

L'aire de Crépy-en-Valois se caractérise par un taux d'admissions en ALD pour la maladie d'Alzheimer et autres démences plus faible que dans la région picarde et même qu'en France métropolitaine (75,4 pour 100 000 habitants contre respectivement 91,7 et 89,5).

Les assurés du régime général de l'aire de Crépy-en-Valois sont moins nombreux à avoir eu au moins un remboursement pour psychotrope que dans la région (22,0 % contre 24,1 %).

Prévention

Dépistages : le taux de dépistage du cancer du sein (39,1 %) est moins important qu'en région (45,5 %) contrairement au pourcentage de frottis réalisés (24,4 %) qui lui est plus pratiqué dans l'aire qu'en Picardie (20,8 %).

Périnatalité : le pourcentage de femmes ayant eu moins de 7 consultations prénatales est plus faible dans l'aire (10,3 %) qu'en Picardie (15,7 %).

Vaccination : les vaccinations anti-grippe chez les 65 ans et plus et chez les personnes en ALD sont moins nombreuses dans l'aire qu'en région. Certaines vaccinations infantiles (ROR, hépatite B) sont moins bien suivies qu'en région, d'autres (BCG, DTCP) le sont plus.

Actes dentaires : les enfants de douze ans de l'aire de Crépy-en-Valois ont davantage consulté un dentiste et ont eu, davantage de soins dentaires que les enfants picards.

Remerciements à la Drass de Picardie,
et plus particulièrement à M. Henri Vivier,
aux services des Conseils généraux, à la DRTEFP,
à la DGI et aux CAF

Ce document a été imprimé à 200 exemplaires en décembre 2009
Il a été rédigé et mis en page par Christophe Pitel, Anne Ducamp,
Alexandra Fourquier, Olav Favier, Fabien Lhenry, Alain Trugeon (OR2S),
Olivier Zielinski, Jeannine Tison (Urcam),
et Danielle Fontaine (DRSM).